







PRANCHA 6




GRÁFICO 5. Média do número total de mastócitos encontrados no intestino delgado de camundongos BALB/c e C57BL/6 não infectados (após 8 dias de inóculo com o veículo- PBS) ou infectados (durante 8 dias com 20 cistos da cepa ME-49 de *T. gondii*). Para a contagem dos mastócitos utilizou-se 4 cortes com 4 µm de cada porção do intestino delgado, em toda a sua extensão, de cada animal submetido à infecção, com auxílio da objetiva de 40x. Azul de Toluidina. * $P= 0,0020$. ** $P< 0,0001$.

PRANCHA 7

FIGURAS A e C. Fotomicrografias de intestinos delgados de animais controle, após 8 dias de inóculo com PBS. Material incluído em Paraplast[®]. Hematoxilina e Eosina. Cortes de 4 µm.





FIGURAS B e D. Fotomicrografias de intestinos delgados de animais infectados durante 8 dias pela cepa ME-49 de *T. gondii*. Material incluído em Paraplast[®]. Hematoxilina e Eosina. Cortes de 4 µm.

FIGURA A. Camundongo BALB/c. Nota-se vilosidades íntegras. Epitélio (E). Lâmina própria (LP). 100 X.

FIGURA B. Camundongo BALB/c. Nota-se o alargamento das vilosidades exibindo alterações histopatológicas. Epitélio (E). Lâmina própria (LP). Plasmócitos (cabeças de setas). 150 X.

FIGURA C. Camundongo C57BL/6. Panorâmica de vilosidades íntegras. Epitélio (E). Lâmina própria (LP). 100 X.

FIGURA D. Camundongo C57BL/6. Panorâmica de vilosidades com alterações histopatológicas, encurtamento e alargamento das mesmas. Epitélio (E). Lâmina própria (LP). 100 X.



PRANCHA 8

FIGURAS A a D. Fotomicrografias de órgãos após imunohistoquímica evidenciada pela fosfatase alcalina revelada pelo *fast red*-naftol. Contracoloração com Hematoxilina de Meyer. Material incluído em Paraplast®. Cortes de 4 µm.

FIGURA A. Presença de parasitas (cabeças de setas) no fígado de camundongo BALB/c após 8 dias de infecção pela cepa ME-49 de *T. gondii*. 250 X.

FIGURA B. Presença de parasitas (cabeças de setas) no encéfalo de camundongo C57BL/6 após 8 dias de infecção pela cepa ME-49 de *T. gondii*. 500 X.

FIGURA C. Presença de parasitas (cabeças de setas) no interior de células da mucosa do intestino delgado de camundongo BALB/c após 8 dias de infecção pela cepa ME-49 de *T. gondii*. 500 X.

FIGURA D. Presença de parasitas (cabeças de setas) no interior de células da mucosa (M), submucosa (SM) e muscular (Mu) do intestino delgado de camundongo C57BL/6 após 8 dias de infecção pela cepa ME-49 de *T. gondii*. 250 X.