

Tabela 7: As espécies cultivadas em viveiro e implantadas na área revegetada da mata de galeria da Fazenda Mandaguari no Município de Indianópolis, MG. Os grupos ecológicos P: pioneira, P(si): pioneira secundária inicial, NP: não pioneira; CE: espécies de cerrado as indicações são A: áreas encharcadas permanentes, B: áreas com inundações temporárias e C: áreas bem drenadas, não alagadas.

Família	Espécie	nome popular	Grupo ecológico	Indicação
Anacardiaceae	<i>Lithraea molleoides</i> Engl.	aroeira-branca	P(si)	B
Anacardiaceae	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	pau-pombo	P(si)	A,B
Anacardiaceae	<i>Anacardium humile</i> St. Hil.	cajuzinho-do-cerrado	CE	C
Anacardiaceae	<i>Anacardium occidentale</i> L.	caju	P	C
Anacardiaceae	<i>Astronium fraxinifolium</i> Schott.	guarita	P	C
Apocynaceae	<i>Aspidosperma cylindrocarpum</i> Müll.Arg.	peroba-poca	NP	B,C
Apocynaceae	<i>Aspidosperma macrocarpon</i> Mart.	guatambu-do-cerrado	CE	C
Apocynaceae	<i>Aspidosperma parvifolium</i> A. DC.	guatambú	NP	C
Apocynaceae	<i>Aspidosperma tomentosum</i> Mart.	peroba-do-cerrado	NP	C
Bignoniaceae	<i>Jacaranda cuspidifolia</i> Mart.	jacarandá	P	C
Bombacaceae	<i>Chorisia speciosa</i> A. St.- Hil.	paineira	P(si)	B,C
Bombacaceae	<i>Eriotheca gracilipes</i> K.Schum.	aroeira	CE	C
Cecropiaceae	<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul.	embaúba	P	A,B
Clusiaceae	<i>Kielmeyera coriacea</i> Mart.	pau-santo	CE	B,C
Ebenaceae	<i>Diospyros burchellii</i> Hiern	olho-de-boi	CE	B,C
Leguminosae Fabaceae	<i>Senna multijuga</i> (L.C.Richard)	canafístula	P(si)	
Leguminosae Fabaceae	<i>Platypodium elegans</i> Vog.	jacarandá-canzil	P	B,C
Fabaceae	<i>Machaerium opacum</i> Vog.	jacarandá-do-campo	NP	C
Leguminosae	<i>Piptadenia gonoacantha</i> Macbride	pau-jacaré	NP	C
Leguminosae	<i>Acosmium dasycarpum</i> (Vog.) Yakovl.	amargozinha	CE	C
Fabaceae	<i>Ormosia arborea</i> Harms	tento	NP	C
Leguminosae	<i>Inga sessilis</i> Mart.	ingá	NP	B,C
Lecythidaceae	<i>Cariniana estrellensis</i> Kuntze	jequitibá-branco	NP	C
Leguminosae	<i>Acacia polyphylla</i> Clos	monjolo		

Continuação

Família	Espécie	nome popular	Grupo ecológico	Indicação
Leguminosae	<i>Anadenanthera peregrina</i> Speg.	angico-vermelho	P	
Leguminosae	<i>Dimorphandra mollis</i> Benth.	faveira-do-campo	CE	C
Leguminosae	<i>Stryphnodendron adstringens</i> (Mart.) Coville	barbatimão	CE	C
Leguminosae-Caesalpinoideae	<i>Hymenaea courbaril</i> L.	jatobá	NP	B,C
Leguminosae-Caesalpinoideae	<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	tamboril	P(si)	B,C
Leguminosae-Caesalpinoideae	<i>Bauhinia longifolia</i> D. Dietr.		NP	
Leguminosae-Caesalpinoideae	<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	copaífera	NP	C
Fabaceae	<i>Dalbergia miscolobium</i> Benth.	jacarandá-do-cerrado	CE	C
Leguminosae-Mimosoideae	<i>Inga laurina</i> Willd.	ingá-mirim	NP	A,B
Leguminosae-Mimosoideae	<i>Enterolobium gummiferum</i> Macbride	orelha-de-macaco	CE	C
Fabaceae	<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan	angico-do-cerrado	P	B,C
Fabaceae	<i>Dipteryx alata</i> Vogel	baru	NP	C
Melastomataceae	<i>Miconia ferruginata</i> DC.	pixirica	P	C
Melastomataceae	<i>Miconia burchellii</i> Triana	pixirica	P	B,C
Meliaceae	<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro-vermelho	P	C
Myristicaceae	<i>Virola sebifera</i> Aubl.	ucuúba-do-campo	NP	B,C
Myrsinaceae	<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	pororoca	P(si)	A,B,C
Rubiaceae	<i>Genipa americana</i> L.	jenipapo	NP	A,B
Rubiaceae	<i>Alibertia sessilis</i> K. Schum.	marmelada-de-cachorro	NP	B,C
Rutaceae	<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	maminha-de-porca	P(si)	C
Sapotaceae	<i>Pouteria torta</i> Radlk.	guapeva	NP	A
Sterculiaceae	<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	mutambo	P	C
Tiliaceae	<i>Luehea divaricata</i> Mart.	açoita-cavalo	P(si)	B,C
Ulmaceae	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	pau-pólvara	P(si)	C
Verbenaceae	<i>Aegiphila lhotskiana</i> Cham.	milho-de-grilo	CE	C
Verbenaceae	<i>Aegiphila sellowiana</i> Cham.	tamanqueira	P	C